

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

# Coscia Tardia

**Tamaño:** Medio.

**Forma:** Piriforme alargada. Cuello largo, poco acentuado. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado.

**Cavidad del pedúnculo:** Nula o estrecha y casi superficial, a veces mamelonada. **Pedúnculo:** Corto o medio. Fino, leñoso, engrosado y semi-carnoso en su extremo superior, rara vez carnoso en la base. Ruginoso o rojizo. Generalmente recto, a veces curvo o retorcido. Implantado derecho o ligeramente oblicuo.

**Cavidad del ojo:** Estrecha, casi superficial, suavemente ondulada. **Ojo:** Pequeño, completamente abierto. Sépalos amarillentos, puntiagudos, erectos o divergentes con las puntas rizadas hacia fuera.

**Piel:** Lisa, brillante. **Color:** Amarillo pajizo. Sin chapa o con chapa rojo anaranjado o carmín vivo que puede llegar a cubrir más de medio fruto. Punteado muy abundante, diminuto, ruginoso con aureola verdosa sobre el fondo y rojo oscuro sobre la chapa. Pequeña zona ruginosa junto a la base del pedúnculo.

**Tubo del cáliz:** Pequeño, en forma de embudo con conducto largo de anchura media. Los pistilos, muy finos y cortos no sobrepasan la longitud del conducto.

**Corazón:** Tamaño mediano, mal delimitado. Eje abierto, amplio, estrechándose bruscamente hacia el tubo del cáliz. Celdillas medianas, elípticas.

**Semillas:** Tamaño mediano o pequeño. Elípticas, puntiagudas, con o sin espolón. Color castaño rojizo con salientes casi negros.

**Carne:** Blanca. Medio firme, ligeramente mantecosa, jugosa. **Sabor:** Muy dulce, aromático. Muy bueno.

**Maduración:** Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

